

Informationsblatt zur Magenspiegelung (Gastroskopie)

Vorbereitung:

- **Essen bis 6 Stunden und Trinken sind bis 1 Stunde vor der Untersuchung möglich.**
- Medikamente:

Sollten Sie blutverdünnende Medikamente (ASS®, Clopidogrel, Marcumar®, Phenprocoumon, Lixiana®, Xarelto®, Pradaxa®, Eliquis®, Brilique®, Efiend®, Prasugrel) einnehmen, setzen Sie diese **nur nach Rücksprache mit Ihrem Hausarzt oder uns** ab.

Insulinpflichtige Patienten dürfen sich morgens vor der Untersuchung keine Spritze geben. Metformin und andere Zuckertabletten erst nach der Untersuchung einnehmen, andere Medikamente können Sie normal weiter nehmen.

Untersuchung:

- Die Untersuchung ist in der Regel schmerzfrei und dauert nur 5-10 Minuten
- Es wird eine kurze wirksame Beruhigungsspritze gegeben.

nach der Untersuchung:

- **Es besteht für den gesamten Tag eine Fahruntüchtigkeit.**
- Für den Untersuchungstag wird eine Krankmeldung (AU) ausgestellt.
- Nach der Untersuchung bleiben Sie noch für ca. 30 Minuten zur Überwachung in der Praxis.
- Falls Gewebeproben genommen wurden, bekommt ihr Hausarzt innerhalb 1 Woche das Ergebnis der feingeweblichen Untersuchung. In diesem Falle sollten Sie ca. 1 Woche nach der Untersuchung zu Ihrem Hausarzt zur Besprechung gehen.
- Falls Sie keine anderslautenden Empfehlungen bekommen, können Sie nach der Untersuchung wieder essen und trinken.
- Bei Fragen erreichen Sie uns unter der Praxis-Nummer 09171/899445